



VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM LEITE RESIDUAL?

ELE PODE SER A CAUSA DA ALTA FREQUÊNCIA DE
MASTITE EM SUA PROPRIEDADE!



Venha entender
o porquê e aprender
a preveni-lo





O LEITE RESIDUAL É AQUELE QUE FICA RETIDO NO ÚBERE APÓS A ORDENHA

Alguns fatores influenciam nas suas causas e quantidade

ESTRESSE ANTES E DURANTE A ORDENHA

ORDENHA MAL REALIZADA

ESTÁGIO DE LACTAÇÃO DA VACA

EQUIPAMENTOS DE ORDENHA INAPROPRIADOS





COMO EVITAR O LEITE RESIDUAL?

Conduzir os animais até o local de ordenha calmamente para evitar que as vacas "segurem" o leite

Vacas estressadas podem apresentar leite residual

Promover adequada estimulação do úbere ao utilizar a caneca de fundo escuro, *pré-dipping* e secagem dos tetos

INICIAR A ORDENHA ATÉ 1,5 MINUTO APÓS REALIZAR ESSES PROCEDIMENTOS DE HIGIENE



Se necessário, reajustar o conjunto de ordenha para que não entre ar nas teteiras

Gotículas de leite contaminado podem voltar ao canal do teto, isso aumenta as chances de mastite e impossibilita uma ordenha completa



Realizar a ordenha até que o úbere seja completamente esgotado




**CUIDADO COM A SOBREORDENHA
(ordenhar sem leite)**





PORTANTO, LEMBRE-SE SEMPRE...



Certifique-se de que todos os equipamentos de ordenha estão com a manutenção em dia


Promova o manejo adequado dos seus animais



Realize os procedimentos de ordenha corretamente, evitando deixar leite no úbere ao final do processo

O acúmulo de leite residual no úbere é uma das possíveis causas de mastite e consequente aumento da CCS do tanque, **TOME CUIDADO!**





REFERÊNCIAS



SANTOS, M; SILANO, C. Leite residual pós-ordenha e ocorrência de mastite. **MilkPoint**, 2012. Disponível em:
<

SANTOS, M. **Controle da Mastite e Qualidade do Leite, Desafios e Soluções.** 1 ed, 2019.

Folder elaborado por Julia Maria Ebeling, voluntária no Projeto de Extensão:
Perfil da Produção de Leite em Busca da Melhoria da Qualidade

