

TRANSMISSÃO:

A diarreia e a disenteria geralmente são adquiridas pelo consumo de água e alimentos contaminados.



DIARREIA E DISENTERIA

Podem ser causadas por diferentes microrganismos infecciosos (bactérias, vírus e outros parasitas, como os protozoários). Eles podem provocar a gastroenterite – inflamação do trato gastrointestinal – que afeta o estômago e o intestino.

*Algumas causas não infecciosas: uso de medicamentos como antibióticos, doenças como a doença de Chron e intolerâncias alimentares.

ATENÇÃO ESPECIAL:

Crianças e idosos , correm risco de desidratação grave. Nestes casos, a procura por serviços de saúde deve ser realizada em caráter de urgência.

SAÚDE COLETIVA UFRPR

DIARREIA E DISENTERIA



Folder educativo desenvolvido na disciplina de Saúde Coletiva vinculada ao Projeto de Extensão Educação em Saúde Ambiental e Sustentabilidade. Departamento de Saúde Coletiva - Curso de Farmácia - UFPR.

Autores:

Dina V. Taboada.

Orientadora: Profa. Dra. Beatriz Cristina Konopatzki Hirota.
Coordenadora do Projeto: Profa. Dra. Cristiane Da Silva Paula de Oliveira

1julho/2022

FORMAS DE PREVENÇÃO:

- Lavar as mãos com água e sabão antes de preparar os alimentos e após usar o banheiro.
- Beber somente água tratada, filtrada ou fervida.
- Manter os depósitos de água sempre fechados e fazer a limpeza regularmente.
- Proteger os alimentos de moscas, baratas e ratos.
- Lavar adequadamente as verduras e frutas.



FONTE:
Ministério de Saúde.
<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z>

5

SINAIS E SINTOMAS:

Ocorrência de no mínimo três episódios de diarreia aguda no período de 24hrs (diminuição da consistência das fezes – fezes líquidas ou amolecidas) podendo ser acompanhados de:

- Cólicas abdominais.
- Dor abdominal.
- Febre.
- Sangue ou muco nas fezes (disenteria).
- Náusea.
- Vômitos.



4